



A Fraldas Capricho ajuda
você a cuidar do seu filho!



Idade	Vacinas	Dose	Doenças evitadas
Ao nascer	BCG-ID	Dose única	Formas graves de Tuberculose
	Vacina contra Hepatite B (1)	1ª dose	Hepatite B
1 mês	Vacina contra Hepatite B	2ª dose	Hepatite B
2 meses	Vacina Oral contra a Pólio	1ª dose	Poliomielite (Paralisia Infantil)
	Vacina Tetravalente (2)	1ª dose	Difteria, Tétano, Coqueluche, Meningite e outras infecções por <i>Haemophilus influenzae</i> tipo B
	Vacina Oral contra Rotavírus Humano (3)	1ª dose	Doenças diarreicas por Rotavírus
3 meses	Vacina contra Pneumococos	1ª dose	Otite, Sinusite, Pneumonias, Meningite causadas pelo <i>Streptococcus pneumoniae</i>
	Vacina contra Meningococo C	1ª dose	Doença invasiva causada por <i>Neisseria meningitidis</i> do Sorogrupo C
4 meses	Vacina Oral contra a Pólio	2ª dose	Poliomielite (Paralisia Infantil)
	Vacina Tetravalente	2ª dose	Difteria, Tétano, Coqueluche, Meningite e outras infecções por <i>Haemophilus influenzae</i> tipo B
	Vacina Oral contra Rotavírus Humano (4)	2ª dose	Doenças diarreicas por Rotavírus
	Vacina contra Pneumococos	2ª dose	Otite, Sinusite, Pneumonias, Meningite causadas pelo <i>Streptococcus pneumoniae</i>
5 meses	Vacina contra Meningococo C	2ª dose	Doença invasiva causada por <i>Neisseria meningitidis</i> do Sorogrupo C
6 meses	Vacina contra Hepatite B	3ª dose	Hepatite B
	Vacina Oral contra a Pólio	3ª dose	Poliomielite (Paralisia Infantil)
	Vacina Tetravalente	3ª dose	Difteria, Tétano, Coqueluche, Meningite e outras infecções por <i>Haemophilus influenzae</i> tipo B
	Vacina contra Pneumococos	3ª dose	Otite, Sinusite, Pneumonias, Meningite causadas pelo <i>Streptococcus pneumoniae</i>
9 meses	Vacina contra Febre Amarela (5)	1ª dose	Febre Amarela
12 meses	Tríplice Viral	1ª dose	Sarampo, Rubéola e Caxumba
	Vacina contra Pneumococos	Reforço	Otite, Sinusite, Pneumonias, Meningite causadas pelo <i>Streptococcus pneumoniae</i>
15 meses	Vacina Oral contra a Pólio	Reforço	Poliomielite (Paralisia Infantil)
	Vacina Tríplice Bacteriana	1º Reforço	Difteria, Tétano, Coqueluche
	Vacina contra Meningococo C	Reforço	Doença invasiva causada por <i>Neisseria meningitidis</i> do Sorogrupo C
4 - 6 anos	Tríplice Viral	Reforço	Sarampo, Rubéola e Caxumba
	Vacina Tríplice Bacteriana	2º Reforço	Difteria, Tétano, Coqueluche

(1) A primeira dose da vacina contra a Hepatite B deve ser administrada na maternidade, nas primeiras 12 horas de vida do recém-nascido. O esquema básico se constitui de 03 (três) doses, com intervalos de 30 dias da primeira para a segunda dose e 180 dias da primeira para a terceira dose.

(2) O esquema de vacinação atual é feito aos 2, 4 e 6 meses de idade com a vacina Tetravalente e dois reforços com a Tríplice Bacteriana (DTP). O primeiro reforço aos 15 meses e o segundo reforço entre 4 e 6 anos.

(3) É possível administrar a primeira dose da Vacina Oral de Rotavírus Humano a partir de 1 mês e 15 dias a 3 meses e 7 dias de idade (6 a 14 semanas de vida).

(4) É possível administrar a segunda dose da Vacina Oral de Rotavírus Humano a partir de 3 meses e 7 dias a 5 meses e 15 dias de idade (14 a 24 semanas de vida). O intervalo mínimo preconizado entre a primeira e a segunda dose é de 4 semanas.

(5) A vacina contra Febre Amarela está indicada para crianças a partir dos 9 meses de idade e quando for viajar para o exterior, vacinar contra Febre Amarela 10 (dez) dias antes da viagem.